



# DARŽOVIŲ SĖKLOS

syngenta®





# turinys

■ baltieji gūžiniai kopūstai . . . . .	4	■ pekininiai kopūstai . . . . .	23
<b>N</b> Rosberg F1, <b>N</b> Vettel F1, <b>N</b> Senna (SGW0747), Gallican F1 . . . . .	4	Sprinkin F1, <b>N</b> Marrio F1 . . . . .	23
<b>N</b> ● Kilaprince F1, <b>N</b> ● Kilabaron F1, ● Kilagreg F1, <b>N</b> Toreador F1 . . . . .	5	Hibridinių augalų charakteristika . . . . .	23
● Kilaherb F1, <b>N</b> ● Kilacees F1, Elastor F1, Ramco F1 . . . . .	6	Sodinimo ir nuėmimo laikotarpiai . . . . .	23
Adelco F1, <b>N</b> Succesor F1, Professor F1, <b>N</b> Kepler F1 . . . . .	7	■ svogūnai . . . . .	24
Socrates F1, Zenon F1, <b>N</b> ● Kilafox F1 (SGW0440) . . . . .	8	Vision F1, Medaillon F1, <b>N</b> Darko F1 . . . . .	24
● Kilastor F1, Storidor F1 . . . . .	9	<b>N</b> Promotion F1, Progression F1 . . . . .	25
Hibridinių augalų charakteristika . . . . .	10	Hibridinių augalų charakteristika . . . . .	25
Kopūstų sodinimo ir derliaus nuėmimo laikotarpiai . . . . .	11	■ ridikėliai . . . . .	26
■ savojos kopūstai . . . . .	9	Rondar F1, <b>N</b> Cesar F1, Treto F1 . . . . .	26
Atractum F1. . . . .	9	Sodinimo ir nuėmimo laikotarpiai . . . . .	26
Hibridinių augalų charakteristika . . . . .	10	■ paprastosios morkos . . . . .	27
Kopūstų sodinimo ir derliaus nuėmimo laikotarpiai . . . . .	11	Yukon F1, Champion F1 . . . . .	27
■ raudonieji gūžiniai kopūstai . . . . .	12	Hibridinių augalų charakteristika . . . . .	27
<b>N</b> Chiara SGX0084 F1, <b>N</b> SGX0075 F1 . . . . .	12	■ agurkai . . . . .	28
Hibridinių augalų charakteristika . . . . .	12	<b>N</b> Spear F1 (CP1814), Ekol F1, Pasalimo F1 . . . . .	28
■ žiediniai kopūstai . . . . .	13	<b>N</b> Octopus F1 . . . . .	29
<b>N</b> Solistar F1, Bering F1, <b>N</b> Guideline F1, <b>N</b> ● Clasic F1(SGC3143) . . . . .	13	Hibridinių augalų charakteristika . . . . .	29
<b>N</b> Andromeda F1, Almagro F1, Speedstar F1, Gohan F1 . . . . .	14	■ cukinijos . . . . .	30
■ inovaciniai žiediniai kopūstai. . . . .	15	Hibridinių augalų charakteristika . . . . .	30
<b>N</b> Cartesio F1, <b>N</b> FlameStar F1, <b>N</b> Grafitti F1 . . . . .	15	■ lapiniai kopūstai. . . . .	30
Hibridinių augalų charakteristika . . . . .	16	Winnetou F1 . . . . .	30
Sodinimo ir nuėmimo laikotarpiai . . . . .	16	■ arbūzai . . . . .	31
■ brokoliai . . . . .	17	<b>N</b> Mirsini F1, <b>N</b> Karistan F1 . . . . .	31
<b>N</b> Gongga F1, <b>N</b> Beany F1, <b>N</b> Sambuco F1 (SG-0089). . . . .	17	arbūzai – augalų charakteristikos . . . . .	31
Besty F1, ● Monclano F1 . . . . .	18	■ pomidorai. . . . .	32
Hibridinių augalų charakteristika . . . . .	19	Brooklyn F1, Baribine F1, Sandoline F1. . . . .	32
Sėjos ir derliaus nuėmimo datos . . . . .	19	Carmello F1, Bacalar F1, Arawak F1 . . . . .	33
■ briuselio kopūstai . . . . .	19	Manekro F1, Mamston F1 . . . . .	34
Martinus F1 . . . . .	19	Bobcat F1, Hapynet F1, <b>N</b> Miceno F1 . . . . .	35
■ salotos . . . . .	20	Edamso F1 . . . . .	36
Funly, <b>N</b> Prodigio (LS18467), Crispagio, Dagan . . . . .	20	Hibridinių augalų charakteristika . . . . .	36
Challenge, Ice wave . . . . .	21	■ vienametės paprikos . . . . .	37
Sodinimo ir derliaus nuėmimo terminai. . . . .	21	Yecla F1, <b>N</b> Katmandu F1, Jupiter . . . . .	37
■ špinatai . . . . .	22	<b>N</b> Kiiroi F1, <b>N</b> Kornelya F1, Sahem F1 . . . . .	38
<b>N</b> El Giga (LDSP 997), <b>N</b> El Fortunado. . . . .	22	Hibridinių augalų charakteristika . . . . .	39
Hibridinių veislių charakteristika. . . . .	22		

NAUJIENA

**Rosberg F1** meistriškas greitis**Augalo ypatybės:**

- vegetacijos periodas 49 - 52 d. ankstyviausia veislė rinkoje!
- labai greitai užsipildo gūžės
- formuoja tankias, suapvalintas gūžes
- gūžės taisyklingos, vienodo dydžio
- nepūva apatinę pusę
- skirtas ankstyvai šviežių produktų rinkai

NAUJIENA

**Vettel F1** meistriškas derlius**Augalo ypatybės:**

- vegetacijos periodas 52 - 57 d.
- stambios, apvalios formos gūžės
- tamsūs, blizgantys lapai
- aukštas kotas, todėl lengviau nuimti derlių
- trumpa vidinė šerdis
- stiprus ir sveikas hibridas
- atsparūs trūkinėjimui

NAUJIENA

**Senna (SGW0747)** stambi gūžė per trumpą laiką**Augalo ypatybės:**

- vegetacijos periodas 58 - 62 d.
- aukšta, apvali gūžė
- vešli lapija
- vidutinis gūžės svoris 1,5 - 2,0 kg
- ilgas derliaus nuėmimo laikotarpis

**Vartojimas:**

prekybai, šviežiam vartojimui

**Pastabos:**

rekomenduojama auginti atvirame grunte ir po priedangomis.

**Gallican F1** puikiai tinka salotoms**Augalo ypatybės:**

- vegetacija 73 - 80 d.
- hibridas labai išlygintas
- gūžės apvalios, standžios, subtili vidinė struktūra, puikiai tinka salotoms
- gūžės svoris iki 3 - 4 kg, palankiomis sąlygomis po 75 dienų gali siekti virš 3 kg
- atsparus trūkinėjimui, galima ilgiau laikyti lauke
- subtili lapo struktūra
- aukštai iškelta gūžė

**Vartojimas:**

vidutiniškai ankstyvi kopūstai, skirti prekybai, rauginimui ir salotoms

**Pastabos:**

gali būti auginama skirtingais laikotarpiais

## Kilaprince F1



didelis derlingumas ir atsparumas šakny gumbui

### Augalo ypatybės:

- didelio derlingumo hibridas skirtas ankstyvam perdirbimui
- stambios, apvalios gūžės 5 - 6 kg svorio
- labai stiprus ir sveikas hibridas
- atsparus šakny gumbui
- vegetacijos periodas 90 - 95 d.
- atsparūs kopūstų fuzariozei

### Vartojimas:

ankstyvam perdirbimui

### Pastabos:

patikimas laukams, kur padidėjęs jautrumas šakny gumbui

NAUJIENA

## Kilabaron F1



didelis derlingumo potencialas

### Augalo ypatybės:

- perdirbimui skirtas hibridas su dideliu derlingumo potencialu
- gūžės apvalios, užauga iki 6 - 8 kg
- vegetacijos periodas 105 - 115 d.
- hibridas atsparus kopūstų šakny gumbui
- kopūstai gali ilgai būti lauke nenuimti neprarasdami kokybės
- labai stiprus ir sveikas hibridas

### Pastabos:

tinka naudoti nenutrūkstamai gamybos grandinei kartu su Kilaprince ir Kilaplone hibridais

NAUJIENA

## Kilagreg F1

ankstyvesnis kopūstų hibridas, atsparus šakny gumbui



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos laikotarpis apie 75 - 80 d.
- skirta auginti pavasarį po plokščiomis uždangomis ir atvirame lauke
- ovalios gūžės, kompaktiškos, puikios vidinės struktūros
- gūžių svoris - 2,5 - 3 kg
- hibridas atsparus šakny gumbui ir gūžių trūkinėjimui

### Paskirtis:

Skirta šviežių daržovių rinkai ir ankstyvam rauginimui

### Pastabos:

galima auginti didesniu tankumu

## Toreador F1

didelis atsparumas tripsams



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos trukmė 105 - 110 d.
- išlygintas hibridas
- didelė tolerancija tripsams
- gūžės iki 2 - 3 kg
- gali būti auginami didesniu tankumu
- galima ilgiau laikyti lauke išsaugojant kokybę
- lapai padengti stipria vaško danga

### Paskirtis:

- šviežiai rinkai
- vasaros derliui

### Pastabos:

puiki prekinė išvaizda

NAUJIENA

## Kilaherb F1 kokybiškas hibridas šviežiai rinkai



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos laikotarpis 105 d.
- hibridas atsparus šaknų gumbui, fuzariozei, tripsams
- gūžės apvalios, iki 4 kg svorio

**Vartojimas:** šviežiai rinkai ir rauginimui

### Pastabos:

atsparus gūžių trūkinėjimui, galima ilgiau palikti lauke

## Kilacees F1 ideali vidinė struktūra



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos periodas 105 - 110 d.
- aukšta prekinė kokybė dėl apvalių ir lygių gūžių
- puikios vidinės struktūros
- hibridas atsparus trūkinėjimui

### Paskirtis:

tinka šviežiai rinkai

### Pastabos:

lauke palikti kopūstai ilgai nepraranda kokybės

## Elastor F1 vasaros ir rudens derliui



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos laikotarpis 110 - 140 d.
- pasižymi puikia vidine struktūra
- apvalios gūžės iki 2,5 kg užauga maždaug per 110 dienų ir paliktos lauke pasiekia iki 6 - 7 kg svorį
- labai stiprus ir sveikas hibridas, atsparus fuzariozei, bakterinėms ligoms
- pasižymi aukšta tolerancija tripsams
- pasižymi tolerantiškumu grybinėms ligoms

### Paskirtis:

tinka vasaros ir vėlyvam rudens derliui, ilgesniam sandėliavimui

## Ramco F1 idealiai tinka rauginimui



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos laikotarpis 120 - 130 d.
- gūžės stambios, kietos, turinčios puikią vidinę struktūrą, 4 - 6 kg svorio
- vidutinio aukščio tvirtas kotas
- augalai auga greitai, nes turi stiprią šaknų sistemą
- atsparūs fuzariozei

### Paskirtis:

- tinka rauginimui rudenį ir žiemą
- po derliaus nuėmimo gūžės galima sandėliuoti 3 - 4 mėnesius

### Dėmesio:

kopūstai gali ilgai būti lauke nenuimti ir neprarasti kokybės, tinka auginti įvairiose dirvose

## Adelco F1 kokybiškas hibridas rudens derliui



### Augalo ypatybės:

- vegetacija 125 - 135 d.
- gūžės išauga iki 8 - 9 kg svorio, labai geros vidinės struktūros
- gūžės tolygios formos ir svorio
- stipri šaknų sistema garantuoja aukštą derliaus stabilumą auginant įvairiuose dirvožemiuose
- labai derlingas hibridas

### Vartojimas:

tinka perdirbimui ir trumpam sandėliavimui

### Pastabos:

galima ilgiau palikti lauke neprarandant kokybės

## Succesor F1 sėkmės garantas



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos periodas 120 - 130 d.
- stiprus ir sveikas hibridas
- aukštas kotas, gūžės paplokščios
- tolerancija Xanthomonas (kopūstų gyslų bakteriozei).
- lapai padengti storu vaško sluoksniu
- garantuotas derlius esant skirtingoms auginimo sąlygoms.

### Paskirtis:

šviežiai produktų rinkai ir perdirbimui.

### Pastabos:

- šviežiai rinkai rekomenduojama auginti didesniu tankumu (35/38000)
- hibridas atsparus stresinėms auginimo sąlygoms

## Professor F1 geras derlius net ir nepalankiomis sąlygomis



### Augalo ypatybės:

- vegetacija 130 - 140 d.
- auginant rečiau (27 tūkst. augalų/ha) gūžės užauga iki 8 - 9 kg. svorio, šiek tiek paplokščios formos, puikiai tinka perdirbimui
- auginant tankiau, gūžės išauga iki 3 - 4 kg svorio, puikiai tinka sandėliavimui
- aukštas atsparumas tripsams
- augalas labai gyvybingas ir sveikas

### Vartojimas:

prekybai ir perdirbimui

### Pastabos:

atsparus vaškinis sluoksnis, aukštas atsparumas daigų pašaknio puviniai

## Kepler F1 stabilus derlius esant nepalankioms aplinkos sąlygoms



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos periodas 135 - 140 d.
- gūžės svoris 3,5 - 4,5 kg
- stiprus ir sveikas hibridas
- atsparus tripsams
- puikios vidinės struktūros
- gerai laikosi lauke ir sandėliuose
- atsparus fuzariozei

### Paskirtis:

tinka labai ilgam sandėliavimui

### Pastabos:

- pasižymi gausiu derliumi
- Ilgai išliekanti žalia lapų spalva po laikymo

**Socrates F1** didelės gūžės vėlyvam derliui**Augalo ypatybės:**

- vegetacijos laikotarpis 140 - 145 d.
- stambios, sunkios 5 - 6 kg gūžės pasižymi puikia vidine struktūra
- labai stiprus ir sveikas hibridas, atsparus fuzariozei, bakterinėms ligoms
- didelis sausųjų medžiagų kiekis lemia puikią raugintų kopūstų kokybę

**Paskirtis:**

- ilgam sandėliavimui iki kovo mėnesio
- rauginimui žiemą ir perdirbimui

**Zenon F1** gausus derlius, ilgam saugojimui**Augalo ypatybės:**

- vegetacijos laikotarpis 130 - 140 d.
- gūžės apvalios, 3,5 kg svorio, puikios vidinės struktūros
- stipri šaknų sistema
- atsparūs fuzariozei
- gausus ir stabilus derlius net ir skirtingomis augimo sąlygomis

**Paskirtis:**

ilgam sandėliavimui iki gegužės mėnesio

**Kilafox F1 (SGW0440)** didelis derlius, atsparumas šaknų gumbui**Augalo ypatybės:**

- vegetacijos periodas 130 - 140 d.
- didelis derliaus potencialas
- gūžės apie 5 kg
- sandėliavimas iki kovo mėn.
- atsparumas šaknų gumbui ir FOC:1 (fuzariozei)
- gūžės yra apvalios
- lengvai nusiima lapai po laikymo

**Paskirtis:**

šviežiam vartojimui ir perdirbimui



## Kilastor F1

atsparūs ligoms, derlingi, ilgam saugojimui



### Augalo ypatybės:

- vegetacija 140 - 145 d.
- gūžės užauga iki 4 - 6 kg svorio, priklausomai nuo sodinimo tankumo
- veislė atspari šaknies gumbui, lapų galiukų puviniai
- geras derlius dėl aukšto atsparumo ligoms
- net ir ilgai sandėliuojant išlaiko sodrią žalią spalvą
- tinka šviežiam vartojimui ir perdirbimui

### Vartojimas:

šviežiam vartojimui, perdirbimui ir ilgam sandėliavimui

### Pastabos:

gera lapo struktūra (subtiliai gyslotas)

## Storidor F1

vidutinio dydžio, ilgam sandėliavimui



### Augalo ypatybės:

- gūžės 2,5 - 3,5 kg, intensyvios žalios spalvos, kuri gerai išsilaiko sandėliuojant
- gausus derlius, gūžės tolygaus dydžio ir formos
- vidutiniškai atsparus auginant sudėtingesnėmis sąlygomis
- aukštas kotas, todėl lengviau nuimti derlių
- vegetacijos laikotarpiu būdingas stiprus ir intensyvus augimas, intensyviai auga lapų rozetė, stabdanti vandens išgaravimą ir piktžolių atsiradimą,

- hibridas atsparus puviniai
- stipri šaknų sistema

### Paskirtis:

tinka šviežiai rinkai ir ilgam sandėliavimui

### Dėmesio:

kokybiška tolygi vidinė struktūra, idealiai tinka komerciniam perdirbimui

savojos kopūstai

## Atractum F1

itin ilgai išliekantis pavasarį



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos periodas: pavasaris 75 - 95 d, vasara 65 - 75 d.
- Gūžės svoris nuo 1,0 - 3,5 kg priklausomai nuo tankumo ir vegetacijos laikotarpio
- ilgas derliaus nuėmimo laikotarpis – didelė tolerancija trūkinėjimui
- atsparus puviniams
- patraukli gūžės spalva, daug dengiamųjų lapų, apvalios formos
- pavasario, vasaros ir rudens produkcijai

### Paskirtis:

šviežiai daržovių rinkai

### Pastabos:

trumpas auginimo sezonas padeda išvengti baltasparnių antplūdžio

## Hibridinių augalų charakteristika

Hibrido pavadinimas	augalų skaičius tūkst./Ha	vegetacijos periodas dienomis	atsparumas trūkinėjimui	gūžės svoris	paskirtis		
					perdirbimui	sandėliavimui	šviežiam vart.
<b>N Rosberg F1</b>	45 - 50	49 - 52	■ ■	1,1 - 1,5			■
<b>Mirror F1</b>	45 - 50	48 - 55	■ ■	1,2 - 1,4			■
<b>Kevin F1</b>	45 - 50	50 - 55	■ ■	1,2 - 2			■
<b>N Vettel F1</b>	45 - 50	52 - 57	■ ■	1,2 - 1,8			■
<b>Bolikor F1</b>	35 - 38	58 - 61	■ ■ ■	1,6 - 2,1	■		■
<b>N Senna (SGW0747)</b>	35 - 38	58 - 62	■ ■	1,5 - 2			■
<b>Galican F1</b>	32 - 35 (30)	73 - 80	■ ■ ■	3 - 4	■		■
<b>Gregorian F1</b>	35 - 38	72 - 75	■ ■ ■	3 - 3,5	■		■
 <b>Kilagreg F1</b>	30 - 35	75 - 80	■ ■ ■	2,5 - 3			■
<b>Flexton F1</b>	28 - 32	85 - 95	■ ■ ■ ■	3 - 7	■		■
 <b>Kilacees F1</b>	30 - 40	105 - 110	■ ■ ■ ■	2,5 - 3,5			■
 <b>Kilaherb F1</b>	30 - 35	105 - 110	■ ■ ■ ■	3 - 4	■		■
<b>Toreador F1</b>	30 - 40	105 - 110	■ ■ ■ ■	2 - 3			■
<b>Elastor F1</b>	30 - 32	110 - 140	■ ■ ■	6 - 7		■	■
<b>Ramco F1</b>	29 - 32	120 - 130	■ ■ ■	7 - 9	■		■
<b>Adelco F1</b>	28 - 32	125 - 135	■ ■ ■	8 - 9	■	■	■
<b>Agressor F1</b>	30 - 32	125 - 135	■ ■ ■	3 - 8	■	■	■
<b>Successor F1</b>	30 - 32	125 - 135	■ ■ ■		■	■	■
<b>Liberator F1</b>	29 - 30	130 - 135	■ ■ ■	5 - 7	■	■	■
 <b>N Kilafox F1</b>	30 - 35	130 - 140	■ ■ ■ ■	3,5 - 5	■	■	■
<b>Professor F1</b>	30 - 32 (27)	130 - 140	■ ■ ■	3,5 - 4 (8 - 9)	■	■	■
<b>Socrates F1</b>	30 - 32	140 - 145	■ ■ ■	5 - 6	■	■	■
<b>Zenon F1</b>	30	140	■ ■ ■ ■	3,5 - 4,5	■	■	■
<b>Prodikos F1</b>	30 - 35	140 - 145	■ ■ ■	3 - 4,5		■	■
 <b>Kilastor F1</b>	30 - 35	140 - 145	■ ■ ■ ■	4 - 6	■	■	■
<b>Storidor F1</b>	30 - 40	130 - 135	■ ■ ■ ■	2,5 - 3,5	■	■	■

## Savojos kopūstai

Hibrido pavadinimas	augalų skaičius tūkst./Ha	vegetacijos periodas dienomis	atsparumas trūkinėjimui	gūžės svoris	paskirtis		
					perdirbimui	sandėliavimui	šviežiam vart.
<b>Atractum F1</b>	30 - 35	85 - 95	■ ■ ■	1 - 2,5			
<b>Milletta F1</b>	35 - 40	105 - 110	■ ■ ■	2 - 2,5	■	■	■

N – nauji

 – hibridas atsparus šakny gumbui

Atsparumas trūkinėjimui: ■ - mažas, ■ ■ ■ ■ - didelis



Kopūstų sodinimo ir derliaus nuėmimo laikotarpiai

Hibrido pavadinimas	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
<b>N</b> Rosberg F1			█	█	█	█						
Mirror F1			█	█	█	█						
Kevin F1			█	█	█	█						
<b>N</b> Vettel F1			█	█	█	█						
Bolikor F1			█	█	█	█						
<b>N</b> Senna (SGW0747)			█	█	█	█						
Galican F1				█	█	█	█	█				
Gregorian F1				█	█	█	█	█				
Kilagreg F1				█	█	█	█	█				
Flexton F1				█	█	█	█	█	█	█		
Kilacees F1				█	█	█	█	█	█	█		
Kilaherb F1				█	█	█	█	█	█	█		
Toreador F1				█	█	█	█	█	█	█		
Elastor F1				█	█	█	█	█	█	█		
Ramco F1				█	█	█	█	█	█	█		
Adelco F1				█	█	█	█	█	█	█		
Agressor F1				█	█	█	█	█	█	█	█	
Successor F1				█	█	█	█	█	█	█	█	
Liberator F1				█	█	█	█	█	█	█	█	
<b>N</b> Kilafox F1				█	█	█	█	█	█	█	█	
Professor F1				█	█	█	█	█	█	█	█	
Socrates F1				█	█	█	█	█	█	█	█	
Zenon F1				█	█	█	█	█	█	█	█	
Prodikos F1				█	█	█	█	█	█	█	█	
Kilastor F1				█	█	█	█	█	█	█	█	
Storidor F1				█	█	█	█	█	█	█	█	

savojos kopūstai

Hibrido pavadinimas	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
Atractum F1			█	█	█	█	█	█	█	█	█	
Miletta F1				█	█	█	█	█	█	█	█	

█ – sodinimas █ – nuėmimas



## Chiara SGX0084 F1 graži spalva ir tekstūra



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos periodas 80 - 95 d.
- atsparus FOC: 1 (fuzariozei)
- tamsi lapų spalva, apvalios gūžės
- gera vidinė struktūra
- lapai padengti storu vaško sluoksniu
- ilgas derliaus nuėmimo laikotarpis

### Paskirtis:

- šviežiai produktų rinkai ir perdirbimui
- ilgas derliaus nuėmimo laikotarpis

### Pastabos:

- sodinimas nuo kovo mėn. pabaigos
- iki birželio mėn. pabaigos

## SGX0075 F1 stiprus gyvybingumas ir derlingumas



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos periodas 95 - 110 d.
- stiprus ir sveikas hibridas
- gūžių masė 2 - 3,5 kg
- lapai padengti storu vaško sluoksniu
- sandėliavimas iki vasario mėn. iš vėlai pasodintų augalų

### Paskirtis:

- perdirbimui ir šviežiai rinkai



### Hibridinių augalų charakteristika

Hibrido pavadinimas	sodinimo tankis tūks./ha	vegetacijos laikotarpis dienomis	gūžės		sodinimo ir nuėmimo laikotarpiai									
			atsparumas trūkinėjimui	vidutinis svoris, kg	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	
Reball F1	35 - 45 (55 - 65)	75 - 80	■ ■	1,5 - 2 (0,3 - 0,5)	█		█		█		█		█	
N Chiara F1	35 - 45	80 - 95	■ ■	1,5 - 2,8	█		█		█		█		█	
N SGX0075 F1	32 - 42	95 - 110	■ ■ ■	2 - 3,5	█		█		█		█		█	
Rescue F1	30 - 50	140 - 145	■ ■ ■	1,5 - 4	█		█		█		█		█	

N – naujiena

Atsparumas trūkinėjimui: ■ - žemas, ■ ■ ■ ■ - didelis

█ – sodinimas

█ – nuėmimas

## Solistar F1 itin ansktyvam derliui



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos laikotarpis 55-59 d.
- idealiai tinka auginti po priedangomis
- geras prisitaikymas prie aplinkos sąlygų, didelis atsparumas stresui
- labai gera augalų prekinė išvaizda
- baltas, tankus, kompaktiškas žiedynas net ir mažiau palankiomis oro sąlygomis
- geras žiedyno padengimas lapais
- idealus ankstyvųjų hibridų ir žiedyno derinys

### Paskirtis:

- šviežiai daržovių rinkai

### Pastabos:

- hibridas skirtas auginti šiltnamiuose ir po priedangomis
- žiedynas atrodo patraukliai dėžutėje
- dėl gausaus tręšimo azotu ir stipraus augalo gyvybingumo derlius gali būti nuimamas vėliau

NAUJIENA

## Bering F1 atsparus ligoms, šviežiam vartojimui



### Augalo ypatybės:

- ankstyvas hibridas
- vegetacijos laikotarpis 58 - 63 d.
- žiedynas sniego baltumo, uždengtas stambiais išoriniais lapais

### Paskirtis:

šviežiam vartojimui  
auginti lauke ir po priedangomis

### Dėmesio:

ypatingas atsparumas oro sąlygomis, tinkamas auginti beveik visuose dirvožemiuose

## Guideline F1 didelis stabilumas viso sezono metu



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos periodas 70 - 75 d.
- žiedyno paviršius lygus, aukšta kokybė
- graži apatinė dalies pusė – gerai užsandarinta
- sunkūs, kompaktiški sniego baltumo žiedynai, labai gerai prisidengia
- labai stiprus ir sveikas hibridas net ir sunkiomis oro sąlygomis vasarą
- stresinėmis sąlygomis žiedynai nėra linkę nukentėti nuo šalnų

- aukštas kotas, todėl greitai ir efektyviai nuimamas derlius

### Paskirtis:

šviežiai rinkai

### Pastabos:

- geras našumas gaminant produkciją ištisus metus
- stabilus auginimo sezonas esant mažiau palankiomis aplinkos sąlygomis

NAUJIENA

## Clasic F1 (SGC3143) atsparumas šaknų gumbui, kokybė ir universalumas



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos periodas 80 - 85 d.
- atsparus stresinėms auginimo sąlygoms
- subalansuota augalų forma
- didelis atsparumas šaknų gumbui

### Pastabos:

- aukštos kokybės žiedynai šviežiai rinkai, perdirbimui ir šaldymui
- stabilus derlius net ir sudėtingomis aplinkos sąlygomis

### Paskirtis:

- šviežiai rinkai ir perdirbimui
- rekomenduojamas ankstyvam vasaros derliui ir rudeniiui nuo rugsėjo mėnesio pradžios

NAUJIENA

**Andromeda F1** ryškios baltos spalvos**Augalo ypatybės:**

- vegetacijos periodas 65 - 70 d.
- **tai žiediniai kopūstai, kurių žiedynų nereikia dengti**
- mažesnės auginimo išlaidos, nereikia priedangų
- saulės šviesa neturi įtakos geltonos spalvos atsiradimui ant žiedynų
- skirta šviežiai rinkai, idealiai tinka pardavimui su lapais
- ilgas sandėliavimo laikas po derliaus nuėmimo

**Almagro F1** kokybiškas hibridas vasaros derliui**Augalo ypatybės:**

- vegetacija 80 - 85 d.
- stiprios augimo energijos augalas, stipri lapija, gerai apgaubianti žiedyną
- žiedynai standūs ir sunkūs, aukštos kokybės
- tinka auginti skirtingais laikotarpiais

**Vartojimas:**

šviežiam vartojimui ir perdirbimui

**Pastabos:** aukštas atsparumas nepalankioms sąlygoms

**Speedstar F1** pats ankstyviausias hibridas**Augalo ypatybės:**

- labai trumpas vegetacijos laikotarpis – 52 - 56 d.
- gera žiedyno danga su lapais
- žiedynas standus, baltas, idealios išvaizdos
- lapai nukreipti aukštyn, nelūžta

**Paskirtis:**

tinka šviežiai rinkai ankstyvą pavasarį, auginimui po dangomis

**Pastabos:**

ankstyviausias hibridas

**Gohan F1** stiprus augimas ir puiki kokybė**Augalo ypatybės:**

- vegetacijos laikotarpis – 85 - 90 d.
- stiprus augalas su stipria šaknų sistema
- žiedynas standus, kokybiškas, baltas
- augalas yra atsparus nepalankioms auginimo sąlygoms

**Paskirtis:**

šviežių daržovių rinkai ir perdirbimui

**Pastabos:**

- ypač rekomenduojama vėlyvam vasaros bei rudens derliui (nuo rugpjūčio pabaigos)
- stabilus vegetacijos laikotarpis

## Cartesio F1 „Romanesco” tipo



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos periodas 90 - 110 d.
- stiprus gyvybingumas ir labai gera danga
- „Romanesco” tipas, patraukli ir išskirtinė gūžės forma
- tvirtas, gerai užpildytas žiedynas
- labai aukštos kokybės vienodi žiedynai
- unikalaus saldaus skonio

### Paskirtis:

- šviežiai rinkai ir perdirbimui

### Pastabos:

- rekomenduojama rudens derliui
- po virimo nesijaučia kopūstų kvapo

NAUJIENA

## FlameStar F1 intensyvios spalvos ir skonio



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos periodas 75 - 80 d.
- tinka gamybai visais metų laikais
- gerai lapais padengti žiedynai
- stiprus ir sveikas hibridas
- taisyklinga žiedyno forma
- patraukli prekinė išvaizda
- išskirtinės oranžinės spalvos
- originalaus skonio

### Paskirtis:

- šviežiai rinkai

### Pastabos:

- ilgai išliekanti spalva

NAUJIENA

## Grafitti F1 intensyvios spalvos



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos periodas 80 - 85 d.
- tinkami gamybai visais metų laikais
- būdingas didelis vienodumas
- stiprus ir sveikas hibridas
- taisyklinga žiedyno forma
- patraukli prekinė išvaizda
- išskirtinė violetinė žiedyno spalva

### Paskirtis:

- šviežiai rinkai

### Pastabos:


- rekomenduojama ruošiant maistą virti garuose, kad išsaugoti patrauklią patiekalo spalvą.

NAUJIENA

### Hibridinių augalų charakteristika

Hibrido pavadinimas	vegetacijos laikotarpis dienomis	atsparumas nepalankiom auginimo sąlygom	žiedynas		paskirtis		savybės
			dengimas	kokybė	šviežiam pardavimui	šaldymui	
<b>N Solistar F1</b>	57 - 61	■■■	■■■	■■■	+		ankstyvas derlius
<b>Bering F1</b>	58 - 63	■■■	■■■	■■■	+		sniego baltumo žiedynas
<b>Bruce F1</b>	65 - 68	■■■	■■■	■■■	+	+	galimi du derliai
<b>N Andormeda F1</b>	65 - 70	■■■	neriekia	■■■	+		aukšta kokybė neuždengia žiedyno
<b>Aerospace F1</b>	70 - 75	■■	■■■	■■■	+	+	tolygus derlius
<b>N Guideline F1</b>	70 - 75	■■■	■■■	■■■	+	+	idealiai tinka pagrindiniams ir tarpiniams pasėliams
<b>N Icesteam F1</b>	70 - 80	■■	■■	■■■	+		valgomoji dalis yra žiedynai ir stiebai
<b>Lecanu F1</b>	75 - 80	■■	■■■	■■■	+	+	liepos, rugpjūčio derliui
<b>Claforsa F1</b>	75 - 80	■■	■■■	■■■	+	+	tinkamas dviems derliams
<b>Clapton F1</b>	80 - 85	■■	■■■	■■■	+		idealiai uždengtas žiedynas
<b>Amerigo F1</b>	80 - 85	■■■	■■■	■■■	+	+	atsparus blogom oro sąlygom
<b>Almagro F1</b>	80 - 85	■■■	■■■	■■■	+	+	kokybiškas hibridas vasaros derliui
<b>N Clasic F1</b>	80 - 85	■■■■	■■■■	■■■■	+	+	atsparūs stresinėms sąlygoms
<b>Speedstar F1</b>	52 - 56	■■	■■■	■■■	+		ankstyvam derliui
<b>Gohan F1</b>	85 - 90	■■■■	■■■	■■■	+	+	stiprus augimas ir puiki kokybė
<b>N Cartesio F1</b>	90 - 110	■■	■■■	■■■	+	+	labai aiškios „Romanesco“ formos

### Sodinimo ir nuėmimo laikotarpiai



**N** – naujiena

Atsparūs trūkinėjimams: ■ - žemas, ■■■ - didelis    ■■■■ - sodinimas    ■■■■ - nuėmimas



## Gongga F1 ankstyvumas, stabilumas, derlingumas



### Augalo ypatybės:

- vegetacija 70 - 75 d.
- tamsiai žalios spalvos
- labai geras žiedyno tvirtumas
- smulkūs, vienodi žiedynai
- rekomenduojama sodinti anksti kovo mėn. ir po priedangomis
- kupolo formos žiedynas
- negausi lapija
- derliaus stabilumas esant skirtingoms auginimo sąlygoms
- didelis žiedynų derlius
- žiedynuose nesusidaro tuščių ertmių
- ilgai išlaiko kokybę po derliaus nuėmimo

### Paskirtis:

šviežiai produktų rinkai ir perdirbimui

### Pastabos:

- tinka mechanizuotam nuėmimui
- optimalus derliaus nuėmimo laikas birželio/ liepos mėn. ir rugsėjo mėn. I-II dekada

NAUJIENA

## Beany F1 geriausi rudeniui



### Augalo ypatybės:

- Sėjama po liepos 15 d.
- Vidutinio ankstyvumo – vegetacijos sezonas 75 - 80 d.
- kompaktiškas, subalansuotas žiedynas
- žiedynas neapaugęs lapais
- žiedynuose nesusidaro tuščių ertmių
- stiprus ir sveikas hibridas

### Paskirtis:

šviežiai rinkai ir perdirbimui

### Pastabos:

- idealiai tinka mechanizuotam nuėmimui
- brokoliai pasižymi gūžių vienodumu, todėl derlius nuimamas lengvai
- labai didelis smulkių žiedynų derlius.

NAUJIENA

## Sambuco F1 (SG-0089)

atsparumas šaknų gumbui, didelis derlingumas



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos periodas 90 - 95 d.
- atsparus šaknies gumbui
- stipriai augantis hibridas
- labai kompaktiškas ir sunkus žiedynas
- nedaug dengiamųjų lapų
- tinka šviežiai rinkai ir perdirbimui
- tinka auginant ištiesus metus

### Auginimas:

lauke rekomenduojama sodinti nuo pavasario iki liepos vidurio

NAUJIENA

## Besty F1 šviežiam vartojimui



### Augalo ypatybės:

- ankstyvi, vegetacija apie 65 - 70 d.
- žiedynai kompaktiški, vientisi, išlyginti, apvalios formos, geros prekinės išvaizdos
- ryškiai žalios spalvos
- žiedynuose nesusidaro tuščių ertmių
- nesiformuoja šoniniai ūgliai.

### Vartojimas:

šviežiam vartojimui. Rekomenduojama auginti pavasario ir vasaros, vasaros ir rudens sandūroje

### Pastabos:

greitas ir lengvas paruošimas pardavimui. Geros prekinės išvaizdos.

## Monclano F1 stabilus, geras derlius rudenį



### Augalo ypatybės:

- vegetacija 85 - 90 d.
- stipraus augimo hibridas
- žiedynai kokybiški, geros prekinės išvaizdos
- hibridas atsparus kopūstų šaknies gumbui ir grybelinėms ligoms rudenį


### Vartojimas:

šviežiam vartojimui ar perdirbimui

### Pastabos:

- rekomenduojamas derliaus nuėmimas iki birželio pabaigos ir rudenį (nuo rugsėjo vidurio)
- lengvas skirstymas į žiedus dėl ypatingos žiedų formos
- neauginti nuo liepos iki rugsėjo vidurio

## Hibridinių augalų charakteristika

Hibrido pavadinimas	vegetacijos laikotarpis dienomis	žiedyno spalva	paskirtis		derliaus nuėmimas			savybės
			šviežiam vartojimui	šaldymui	pavasaris	vasara	ruduo	
Montop F1	65 - 75	tamsiai žalia	■	■ ■	■	■		ankstyvas derlius
<b>N</b> Gongga F1	70 - 75	tamsiai žalia	■ ■	■ ■	■	(■)	(■)	anksti pavasarį ir vasarą
<b>N</b> Beany F1	75 - 80	žalia	■ ■	■ ■			■	labai aukštas suderinamumo lygis
Batory F1	80 - 85	žalia	■ ■	■ ■	■		■	gausus ir kokybiškas derlius
Monaco F1	80 - 90	tamsiai žalia	■	■ ■		■	■	neformuoja šoninių ataugų
 Monclano F1	85 - 90	tamsiai žalia	■ ■	■ ■	■		■	kokybiškam rudens derliui
<b>N</b> Sambuco F1	90 - 95	žalia	■ ■	■ ■	■	■		atsparumas šaknų gumbui, didelis derlius

## Sėjos ir derliaus nuėmimo datos



**N** – naujiena

Atsparumas trūkinėjimui: ■ - mažas, ■ ■ ■ ■ - didelis ■ – sodinimas ■ – nuėmimas

## bruselio kopūstai

### Maximus F1 saugojimui ir šaldymui



#### Augalo ypatybės:

- vegetacija apie 120 d.
- derlinga, suformuojanti labai kokybiškas, vienodo didumo gūželes
- gūželės nuo vidutiniškai iki tamsiai žalių, ovalios apie 5,5 cm ilgio ir 4 cm pločio
- tolygus derlius

#### Paskirtis:

tinkami sandėliavimui ir šaldymui

#### Dėmesio:

tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui

## Funly auginimui ištikus metus



### Augalo ypatybės:

- vidutinio ankstyvumo veislė
- salotų gūžės, sveria apie 300 - 350 g
- salotų lapai šviesiai žali, garbanoti
- pasižymi itin geromis skonio savybėmis
- augalai atsparūs nepalankioms augimo sąlygoms
- veislė vidutiniškai atspari mozaikiniam salotų virusui, atspari netikrajai miltligei

### Paskirtis:

veislė skirta auginimui atvirame grunte, šiltnamiuose ir po priedangomis, labai gerai išsilaiko po skynimo

## Prodigio (LS18467) daugiaspalvės, raudonosios salotos



### Atsparumas:

**HR:** Bl: 16-37EU / Nr: 0 (HR)

### Taikymas:

- auginti grunte visą sezoną nuo pavasario iki rudens
- galima auginti šiltnamyje

### Augalo ypatybės:

- labai sodri patraukli raudona lapų spalva
- augalai labai gyvybingi
- ilgai išlieka šviežios po derliaus nuėmimo
- dėl aukšto koto nepūva iš apačios
- patrauklus pasiūlymas praturtinti salotų augintojų komercinę pasiūlą

## Crispagio geriausios ledinių ir romėniškų salotų savybės



### Augalo ypatybės:

- skanios, saldžios gerokai mažesnio kartumo nei romėniškose salotose
- traškūs, sultingi lapai kaip ledinių salotų
- lapai ilgai išlieka švieži ir kokybiški nuėmus derlių, taip pat supjausčius į salotas,
- lapai pjaustant ir apdorojant nelūžinėja

### Paskirtis:

ledinių ir romėniškų salotų mišinys auginimui visą sezoną lauko sąlygomis

## Daguan didelis derlius net ir esant nepalankioms aplinkos sąlygoms



### Taikymas:

Auginti grunte nuo pavasario iki rudens

### Atsparumas:

**HR:** Bl: 16-20, 22-24, 27, 28, 30, 31;  
**IR:** LMV: 1

### Augalo ypatybės:

- didelis atsparumas viršūniniam lapų nudegimui ir apatinių lapų puvimui
- lengvai valoma
- gūžės nuo didelių iki labai didelių
- šviesi lapų spalva
- puikus atsparumas aukštai temperatūrai
- gerai pakenčia transportavimą ir ilgai išlaiko šviežią išvaizdą

## Challenge stabilus augimas vasarą



### Augalo ypatybės:

- skirtos auginti atviraime grunte
- vidutinio dydžio gūžės
- ryškiai žalios spalvos
- veislė atspari tikrajai miltligei

### Paskirtis:

veislė skirta auginimui atviraime grunte

## Ice wave ledinės salotos auginimui visą sezoną



### Augalo ypatybės:

- universali ledinių salotų veislė
- labai atspari salotų netikrajai miltligei
- lengvai suplotos apvalios gūžės, lengva paruošti ir pakuoti
- gūžės apatinė dalis tvirtai susukta, su plokščiomis gyslomis
- didelis atsparumas žydėjimui
- lapai vienodo dydžio ir struktūros, todėl idealiai tinka prekybai
- lapų spalva labai patraukli, lapai gerai priglundę prie gūžės
- ideali pakavimui į kartonines dėžes

### Paskirtis:

uginimui atviraime grunte iki pat rudens

### Atsparumas:

HR: Bl: 16-32 / Nr: 0

## Sodinimo ir derliaus nuėmimo terminai

Veislės pavadinimas	atsparumas	sodinimo ir nuėmimo laikotarpiai									
		Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	
<b>Centore</b>	HR: Bl: 30-32EU	█		█			█				
<b>Funly</b>	HR: Bl:30-32EU; IR: LMV: 1	█		█			█				
<b>Challenge</b>	HR: Bl: 30-31, 37, 38EU / Fol:4; IR: LMV: 1	█		█			█				
<b>Ice Wave</b>	HR: Bl: 29-40EU / Nr: 0 / TBSV	█		█			█				
<b>N Instagraal</b>	HR: Bl: 29-39EU / Fol: 1 / Fol:4; IR: LMV: 1	█		█			█				
<b>Crispagio</b>	HR: Bl: 30-32EU	█		█			█				

**N** – naujiena

HR – aukštas atsparumas; IR – vidutinis atsparumas

Bl – Bremia lactucea; Nr – Nasonovia ribisnigri; LMV – Lettuce Mosaic Virus

█ – sodinimas █ – nuėmimas

## El Giga (LDSP 997) didelis derlius ankstyvą pavasarį ir rudenį



### Atsparumas:

HR: Pfs: 1-17 / Sb

### Veislės ypatybės:

- stiprus, greitai augantis augalas
- stori, vidutinio margumo lapai
- didelis derliaus potencialas
- labai geras lapų ir lapkočio santykis
- intensyvi žalia spalva
- tinka nuimti pavasarį ir rudenį
- tinka perdirbimui ir šviežiai rinkai

## El Fortunado greitai auganti veislė



### Atsparumas:

HR: Pfs: 1-17 / Sb

### Veislės ypatybės:

- apvalūs, tamsūs, vidutinio pločio lapai
- didelis derliaus potencialas
- didelis atsparumas žiedynų formavimuisi
- trumpas vegetacijos laikotarpis
- rekomenduojama pavasario ir rudens, taip pat žiemos derliui
- aukštas augalų gyvybingumas

### Hibridinių veislių charakteristika

Hibrido pavadinimas	atsparumas miltligės sukelėjams	rekomenduojamas derliaus nuėmimo laikas	lapų tipas	augimo greitis	polinkis leisti ūglius	aprašymas
<b>N El Giga</b>	1 - 18	pavasarij, rudenį	ovalus	6	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stiprus, sparčiai augantis augalas</li> <li>▪ vidutinio storio lapas</li> <li>▪ ankstyviausioms sėjos datoms</li> <li>▪ intensyvi žalia spalva</li> </ul>
<b>N El Fortunado</b>	1 - 3, 5 - 19	pavasaris, ruduo, žiema	ovalus	4	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ palyginti trumpas auginimo sezonas</li> <li>▪ greitai auganti veislė</li> <li>▪ didelis atsparumas</li> </ul>
<b>Odysseus</b>	1 - 9, 11 - 16, 18 - 19	pavasaris, ruduo, žiema	ovalus	3	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ špinatų lapai ovalūs, tamsiai žali, lygūs</li> <li>▪ tinka šviežiam vartojimui, perdirbimui</li> <li>▪ veislė atspari ligoms</li> </ul>
<b>Pungi F1</b>	1 - 12, 14 - 16	pavasarij, rudenį	ovalus	7	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lapai ovalios formos, tamsiai žali, blizgūs</li> <li>▪ lapai aukšti, todėl lengviau nuimti derlių</li> <li>▪ labai greitas augimas</li> <li>▪ lapai stori, šiek tiek banguoti, neperauga</li> </ul>

**N** – naujiena

Augimo greitis: 1 – lėtas, 9 – greitas; Jautrumas įsiskverbti į ūglius: 1 – jautrus, 9 – nejautrus

## Sprinkin F1 atsparus žiedynų formavimuisi



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos laikotarpis 55 - 60 d.
- gūžės kompaktiškos, kokybiškos, geros prekinės išvaizdos
- geras derlius

### Paskirtis:

- ankstyvam auginimui po priedangomis ir atviraime grunte
- šviežių daržovių rinkai pavasario – vasaros sezonu

### Dėmesio:

galima auginti iš daigų ar sėklų sėjant 100 000 augalų/ha

## Marrío F1 geriausias pasirinkimas ilgalaikiam saugojimui



### Augalo ypatybės:

- aukšta tolerancija salotų nudegimui „Tipburn“
- puikiai tinkami saugojimui
- išlieka žalia spalva po laikymo
- cilindro formos
- vegetacijos laikotarpis 65 - 70 d.
- gūželių svoris 1,2 - 2,0 kg

### Taikymas:

ilgam sandėlavimui

### Pastabos:

skirta tik rudens produkcijai

NAUJIENA

### Hibridinių augalų charakteristika

Hibrido pavadinimas	vegetacijos laikotarpis dienomis	sodinimo norma tūks./ha	gūžės masė kg	atsparumas šaknų gumbui (HR)	sandėlavimas	savybės
Kilakin F1	50 - 55	60 - 90	1,0 - 2,0	■	■	atsparūs šaknų gumbui
Sprinkin F1	50 - 60	60 - 90	1,0 - 2,0		■ ■	neformuoja žiedynų
<b>N</b> Marrío F1	65 - 70	60 - 90	1,2 - 2,0		■ ■ ■	didelė išeiga po sandėlavimo

### Sodinimo ir nuėmimo laikotarpiai

Hibrido pavadinimas	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
Kilakin F1												
Sprinkin F1												
<b>N</b> Marrío F1												

**N** – naujiena

■ – sodinimas

■ – nuėmimas

## Vision F1 populiariausias Europoje



### Augalo ypatybės:

- vidutinio ankstyvumo hibridas, vegetacija 110 - 115 d.
- lukštas tvirtas, šviesiai rusvo atspalvio
- ropelės apvalios, tolygaus dydžio, kokybiškos, apie 150 g svorio

### Paskirtis:

- tinkami šviežių daržovių rinkai ir ilgam sandėliavimui
- derlius gali būti nuimamas mechanizuotu būdu

### Dėmesio:

rekomenduojama auginti derlingose dirvose reguliariai laistant

## Medaillon F1 gausus didelių svogūnų derlius ilgam laikymui



### Augalo ypatybės:

- „Rijnsburger“ rūšies vidutiniškai vėlyvas hibridas
- gausus, prekybai pritaikytas derlius
- dideli ovalūs svogūnai, lukštas gelsvai rusvos spalvos, gerai priglundęs
- stabilus augalo gyvybingumas visą sezoną
- tinka visiems dirvožemio tipams, ypač mažiau derlingiems

### Paskirtis:

šviežių daržovių rinkai, ilgam sandėliavimui

## Darko F1 didelis derlius, geras sandėliavimas



### Augalo ypatybės:

- intensyvi raudona lukšto spalva
- ypač tinka perdirbimui dėl didelio derliaus potencialo
- ispaniško tipo ovalios formos
- stiprus vegetatyvinis ir generatyvinis augimas

### Taikymas:

perdirbimui ir šviežiai rinkai

### Agrotechninės pastabos:

sėjos norma 2,7 - 3,3 vnt./ha



## Promotion F1 Universalusis „Rijnsburger”



### Augalo charakteristika:

- vidutinio ankstyvumo „Rijnsburger” tipas
- labai ilgai išliekančios savybės
- rekomenduojama auginti geresnėse vietose su galimybe purkšti
- apvalios formos, aukso spalvos
- didelis vienodų ropelių derlius



## Progression F1 auginimui įvairiuose dirvožemiuose



### Augalo ypatybės:

- „Rijnsburger” rūšies hibridas, vidutinio vėlyvumo
- stambios ovalios ropelės
- aukštos kokybės lukštas, išsilaiko iki pat sandėliavimo pabaigos
- kokybiškos prekinės išvaizdos, todėl puikiai tinka pardavimui
- gausus derlius auginant bet kokio derlingumo dirvožemiuose

### Paskirtis:

- šviežių daržovių rinkai
- sandėliavimui labai ilgą laiką (ribotas žiedynų formavimas)

### Hibridinių augalų charakteristika

Hibrido pavadinimas	tipas	vidutinio ankstyvumo	lukšto spalva	sandėliavimas	pastabos
Vision F1	Rijnsburger	vidutinio ankstyvumo	gelsvai rudos spalvos	++++	šviežiai rinkai ir ilgam sandėliavimui
Progression F1	Rijnsburger	vidutinio vėlyvumo	šviesiai ruda	++++	tinka auginti įvairiuose dirvožemiuose
Medaillon F1	Rijnsburger	vidutinio ankstyvumo	tamsiai geltona ruda	++++	stipri šaknų sistema, ypač tinka ilgam sandėliavimui
N Promotion F1	Rijnsburger	vidutinio ankstyvumo	geltona	++++	universalus naudojimas
N Darko F1	Ispaniški	vėlyvumo	raudona	++	didelė grąža

## Rondar F1 vienodos formos ridikėliai



### Augalo ypatybės:

- laikotarpis nuo sėklų sudygimo iki tinkamų vartoti šakniavaisių 18 - 20 d.
- lapai trumpi, tvirti
- šakniavaisiai stambūs (25 - 30 g), apvalūs, skaisčiai raudoni
- ridikėliai nelinkę trūkinėti ir vysti

### Paskirtis:

ankstyvi, tinka auginti šiltnamiuose ankstyvą pavasarį ir vėlyvą rudenį

## Cesar F1 vasaros karalius



### Augalo ypatybės:

- universalus hibridas, skirtas auginti atviraime grunte
- ridikėliai yra ryškiai raudonos, blizgančios spalvos
- išlaiko patrauklių išvaizdą po atvėsimo
- taisyklingos, apvalios formos
- auga trumpais lapais, todėl tinka rišeliniam paruošimui
- patraukli, plona šaknis
- vidutiniškai greitas šakniavaisio augimas, todėl derliaus nuėmimo laikotarpis yra ilgesnis

### Pastabos:

- lengva nuimti derlių dėl optimalaus lapų ilgio
- Ilgai išlaiko šviežią išvaizdą ir spalvą

### Taikymas:

rekomenduojama auginti atviraime lauke nuo balandžio vidurio iki rugpjūčio mėn

## Treto F1 dvispalviai pailgi ridikėliai



### Augalo ypatybės:

- laikotarpis nuo sėklų sudygimo iki tinkamų vartoti šakniavaisių 25 d.
- pailgi raudonos spalvos su baltais galiukais šakniavaisiai
- vidus idealiai baltas, be spalvotų intarpų
- ridikėliai ne aitraus skonio, neporėja, labai patogų pjaustyti
- augalų lapai trumpi, tvirti, todėl puikiai tinka ryšeliams

### Paskirtis:

hibridinis augalas tinkamas auginti po priedangomis

## Sodinimo ir nuėmimo laikotarpiai

Hibrido pavadinimas	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
Rondar F1												
Treto F1												
N Cesar F1												

N – naujiena

— sodinimas — nuėmimas

## Yukon F1 labai sultingos



### Augalo ypatybės:

- vegetacijos laikotarpis apie 100 d.
- šakniavaisiai lygūs, 20 - 22 cm ilgio, tolygios oranžinės spalvos
- morkos atsparios trūkinėjimui ir mechaniniams pažeidimams
- sandėliavimas iki 6 mėn

### Paskirtis:

Šviežių daržovių rinkai ankstyvam vasaros derliui. Taip pat tinka vėlyvai sėjai, rudeninis derlius tinka ilgam sandėliavimui.

## Champion F1 skonio meistrė



### Augalo ypatybės:

- „Nanto” tipo morkos su dideliu derliaus potencialu
- vegetacijos periodas 130 d.
- universalus, skirtas rudeniniam derliui, šviežiai rinkai ir perdirbimui
- labai skanios morkos, patraukli prekinė išvaizda
- „Nanto” tipo morkoms būdingas cilindrinis šakniavaisis
- intensyvi, tolygi oranžinė preinanti į raudoną spalva viduje ir išorėje
- šakniavaisiai 22 - 24 cm ilgio, nelinkę žaliuoti
- gerai išsivystę lapai (didelis atsparumas alternariozei)
- tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui
- Rekomenduojama sėjos norma: šviežia rinka (1,300 tūkst. vnt./ha) arba perdirbimui (800 000/ha)
- tinka plovimui

### Hibridinių augalų charakteristika

Hibrido pavadinimas	tipas	vegetacijos laikotarpis dienomis	šakniavaisiai			mechaninis nuėmimas	sandėliavimas	šviežiam pardavimui	ryšeliais	savybės
			forma	ilgis cm	spalva					
Yukon F1	Nanto	100	cilindrinės	20 - 22	raudonai oranžinė	■	■ ■	■	■	labai ankstyvas hibridas, ilgam sandėliavimui
Champion F1	Nanto	130	cilindrinės	22 - 24	oranžinė ir raudona	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	skanios morkos, duodančios didelį derlių

## Spear F1 (CP1814) didelis derlius per visą sezoną



### Segmentas:

šiltnamio ir lauko kultūros

### Atsparumas:

IR: Cca / CcuCcu/ Px / CMV


### Vaisiai:

- partenokarpinio tipo, stambiavaisiai agurkai
- tiesios, lieknos formos (ilgio ir storio santykis 3,2:1), 9 - 12 cm ilgio,
- tamsiai žalios spalvos, be polinkio gelsti
- tiesūs, pailgi, puikiai tinka salotoms

### Augalas:

- hibridas stiprus, subalansuotas
- derlius reguliarus, daugiausia nuimamas nuo pagrindinio stiebo
- labai geras ankstyvumas ir didelis bendras derlius
- galima auginti lauke

## Ekol F1 ankstyvam derliui



### Augalo ypatybės:

- ankstyvas hibridas pradeda derėti po 42 - 45 d. nuo sėklų sudygimo
- vaisiai apie 10 cm ilgio, cilindro formos, tamsiai žalios spalvos, vidutiniškai kauburiuoti, proporcijos 3,2:1
- agurkai nekartūs
- gausiai dera visą vegetacijos laikotarpį
- atsparūs agurkų rauplėms, tikrajai miltligei, mozaikos virusui

### Paskirtis:

hibridas tinkamas auginti šiltnamiuose bei po laikinomis priedangomis, ypač tinka antram derliui

## Pasalimo F1 gerai dera ir nepalankiomis augimo sąlygomis



### Augalo ypatybės:

- partenokarpinis hibridas
- ankstyvas hibridas, pradeda derėti po 44 dienų nuo sėklų sudygimo
- vaisiai standartiniai nuo 6 iki 12 cm ilgio, 70 g svorio, žali, stambiais žaliais kauburėliais
- agurkai skanūs, nekartūs
- atsparus agurkų rauplėms, tikrajai miltligei, mozaikos virusui

### Paskirtis:

augalas tinkamas auginti atviraime grunte, plėvele dengtuose šiltnamiuose

# Octopus F1 lauko agurkai



## Atsparumas:

- atsparus rauplėms, miltligei ir agurkų mozaikos virusui
- galima auginti ekologiniuose ūkiuose, ekologinėje žemdirbystėje

## Augalo charakteristikos:

- hibridas su stambiais, dominuojančiais moteriškais žiedais
- vidutinio ankstyvumo, labai stipraus augimo
- ypač stipri šaknų sistema
- vaisiai cilindro formos, ilgio ir storio santykis 3:1, nelinkę peraugti
- pašviesintas vaisiaus galas ir šviesūs dryžiai
- tolygus derėjimas
- puiki žaliava perdirbimui
- didelis atsparumas miltligei ir juodajai dėmėligei (tinka naudoti ekologiniams ūkiams)

## Augalo charakteristikos:

atsparumas miltligei turi įtakos labai ilgam ir gausiam derliui.

## Hibridinių augalų charakteristika

Hibrido pavadinimas	atsparumas ligoms	vaisiai (rūšis, forma, spalva, dydis)	auginimo tipas	pagrindinės veislės savybės
<b>Ekol F1</b>	<b>HR:</b> Ccu; <b>IR:</b> Px / CMV	Partenokarpinis, stambiais kauburėliais (ilgis: storis) 3.2:1, šviesiai žalias, 8 - 12 cm	tuneliuose ir šiltnamiuose auginami agurkai	gausus derlius, stabilus augimas įvairiomis oro sąlygomis, optimalus vaisiaus ilgis
<b>Pasalimo F1</b>	<b>HR:</b> Ccu; <b>IR:</b> Px / CMV	Partenokarpinis, stambiais kauburėliais 3.1:1, tamsiai žalias, 8 - 12 cm	tuneliuose ir šiltnamiuose auginami agurkai	lengva auginti, be ūglių, ideali forma ir dydis
<b>Pasamonte F1</b>	<b>HR:</b> Ccu; <b>IR:</b> Px / CMV	Partenokarpinis, stambiais kauburėliais 3.3:1, šviesiai žalias, 8 - 12 cm	tuneliuose ir šiltnamiuose auginami agurkai	lengva auginti, stabilus derlius
<b>Spino F1</b>	<b>HR:</b> Ccu / Px / CMV; <b>IR:</b> Gc / CVYV	Partenokarpinis, stambiais kauburėliais 3.3:1, tamsiai žalias, 8 - 12 cm	tuneliuose ir šiltnamiuose auginami agurkai	gausus derlius ir puikūs, labai geros kokybės vaisiai rudenį
<b>Octopus F1</b>	<b>HR:</b> Ccu; <b>IR:</b> Px / Pcu / CMV	Standartinis, stambiais kauburėliais 3.1:1, šviesiai žalias, 8 - 12 cm	atvira grunte auginami agurkai	gausus ir stabilus derlius, labai sveiki, ideali žaliava pramonei
<b>N Spear F1</b>	<b>HR:</b> Ccu / CMV / Px	Partenokarpiniai, stambiai vaisiai 3,2:1	šiltnamiuose ir tuneliuose auginamos kultūros	geras ankstyvumas ir didelis tolygus derlius

## Hibridinių augalų charakteristika

Hibrido pavadinimas	atsparumas	vaisiaus spalva	savybės
<b>N Cronos F1</b>	WMV / ZYMV / Gc-Px	tamsiai žalios spalvos, intensyvaus blizgesio, idealios kokybės šviežiai rinkai	puiki vaisių kokybė, rekomenduojama ankstyvam derliui po priedangomis ir auginimui vasarą
<b>Angelina F1</b>	Gc/ Px/ CMV / WMV / ZYMV	šviesiai žalia	gausiai dera
<b>Supremo F1</b>	CMV	žalios spalvos, puiki spalva išlieka ir perdirbus	stabilus gausus derlius pramonei
<b>Rhodos F1</b>	CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px	žalios spalvos, gera kokybė šviežiai rinkai	gausus ankstyvas derlius, stabili produkcija visą sezoną, lengvai nuimamas derlius
<b>Naxos F1</b>	CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px	žalios spalvos, aukštos kokybės šviežios rinkos	augalai sveiki, stiprios augimo energijos
<b>Golden Glory F1</b>	ZYMV / WMV / Gc-Px	geltona spalvos	lengvas derliaus nuėmimas, gausus ir stabilus derlius

**N** – naujiena

## lapiniai kopūstai

**Winnetou F1** geros kokybės, šviežiai rinkai**Augalo ypatybės:**

- heterozinė veislė rudens-žiemos derliui
- tamsiai žali lapai, stipriai garbanoti, vėly rudenį nepašviesėja
- augalai užauga iki 1 metro aukščio, atsparūs šalčiui


**Paskirtis:**

šviežių daržovių rinkai

**Pastabos:**

rekomenduojama auginti iš daigų, 3,5 - 4 augalo/m<sup>2</sup>


## Mirsini F1 išsiskiria savo kokybe



### Augalo ypatybės:

- pailgos formos „Crimson” tipo arbūzų hibridas
- vidutinio ankstyvumo ir labai gerai užmezgantys vaisius
- generatyvinis augimo pobūdis
- geras augimas, atsparumas stresui
- išskirtinė išorinė ir vidinė vaisių kokybė
- vienodo dydžio ir formos vaisiai
- labai gera minkštimo kokybė, didelis cukraus kiekis
- būdinga patraukli tamsi ir šviesi spalvos žaliomis juostomis, kurias atpažįsta vartotojai

## Karistan F1 didelis derliaus potencialas



### Augalo ypatybės:

- „Crimson” tipo arbūzai
- vidutinio ankstyvumo
- atsparūs stresinėms sąlygoms, ypač vasarą
- stipriai augantys augalai
- pailgos formos vaisiai
- traškus, saldus minkštimas
- intensyvi raudona spalva
- optimalus vaisių dydis
- didelis produktyvumas

### arbūzai – augalų charakteristikos

Hibridai	vaisių svoris	vegetacijos laikotarpis	forma
Crimson tipo hibridai			
<b>Farao</b>	15 kg	80 dienų	pailgi
<b>N Karistan F1</b>	10-14 kg	75-80 dienų	pailgi
<b>Topgun F1</b>	7-12 kg	70-75 dienos	apvalūs
<b>N Mirsini F1</b>	6-10 kg	62-67 dienos	pailgi

## Brooklyn F1 populariausias



### Augalo ypatybės:

- indeterminantinė veislė
- gausus ankstyvas derlius
- vaisiai stambūs, apie 150 - 170 g svorio
- blizgantys, apvalūs, nežymiai briaunuoti, kieti, patvarūs transportavimui
- augalai atsparūs: tabako mozaikos virusui, verticiliozei, grybinėms ligoms, sukeliančioms fuzariozę, fuzariozinį šaknų puvinį

### Paskirtis:

Tinka auginti po uždangomis ir plėvele dengtuose šiltnamiuose. Taip pat galima auginti šildomuose šiltnamiuose, grunte arba mineralinėje vatoje pavasario-vasaros arba vasaros-rudens laikotarpiu.

## Baribine F1 ryškios spalvos vaisiai



### Augalo ypatybės:

- ankstyvas hibridas
- vaisiai tamsiai raudonos spalvos, 140 - 150g, apskritos formos, šiek tiek briaunuoti
- neturi polinkio į dėmėtumą
- augalas turi stiprų stiebą, vaisiai labai tvirtu vaiskočiu
- vaisiai neformuoja tuščių ertmių
- augalai atsparūs: tabako mozaikos virusui, verticiliozei, Fusarium genties grybinėms ligoms, sukeliančioms fuzariozę

### Paskirtis:

ankstyvam derliui, auginimui šiltnamiuose

## Sandoline F1 tinkami transportavimui



### Augalo ypatybės:

- vaisius 160 - 180 g, intensyviai raudonos spalvos, apvalūs, šiek tiek briaunuoti
- hibridas dviem savaitėm ankstyvesnis nei Brooklyn F1
- vaisiai kieti, ilgai išlaikantys prekinę išvaizdą, tinkami transportavimui
- augalai pasižymi intensyviu augimu, geras balansas tarp vegetatyvinės ir generatyvinės augalo dalies
- stabilus vaisių užmezgimas ir vystymasis, vienodos kekės

**Paskirtis:** auginimui šiltnamiuose

### Atsparumas:

**HR:** ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 / V / Ff: 1-5 / TSWV / M; **IR:** TYLCC



## Carmello F1 ypatingas skonis



### Augalo ypatybės:

- vaisiai sveria apie 200 g, apvaliai plokšti
- pomidorai tamsiai raudoni, mėsingi, ypatingai gero skonio
- stipri augimo energija, užaugina 5 - 7 kekes
- augalai atsparūs: tabako mozaikos virusui, verticiliozei, Fusarium genties grybinėms ligoms, sukeliančioms fuzariozę, fuzariozinį šaknų puvinį, lapų rudąją dėmėtligę

### Paskirtis:

ankstyvas hibridas, skirtas auginti šiltnamiuose ir atviraime grunte

## Bacalar F1 lengvai auginami slyviniai pomidorai



### Atsparumas:

HR: Fol: 0-1 / S / Ss/ Va, Vd, Ma, Mi, Mj /  
TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV

### Segmentas:

Auginama šiltnamiuose ir lauke

### Vaisiai:

- 130 - 140 g svorio, ovalūs, vienodos formos,
- geros išsilaikymo savybės
- raudona spalva ir patrauklus aukštas stiebas

### Augalas:

- Stiprus augalo gyvybingumas,
- stabilus augimas ir vėlesnių kekių vystymasis
- sveikas hibridas
- geras vaisių užsimezgimas, gausios kekės

## Arawak F1 „jaučio širdys“



### Augalo ypatybės:

- vaisiai briaunuoti, sveria apie 120 - 150 g
- patartina reguliuoti vaisių skaičių kekėje ne daugiau 4 vnt
- siekiant išvengti viršūninio vaisių puvinio, patartina naudoti Ca turinčias trąšas
- augalai atsparūs: tabako mozaikos virusui, verticiliozei

### Paskirtis:

trumpos vegetacijos hibridas auginimui po plėvele

## Manekro F1 dideli, mėsingi vaisiai



### Atsparumas:

**HR:** Ff: A-E / Fol / For / TMV: 0 / ToMV / Va, Vd; **IR:** TYLCV

### Segmentas:

Auginami šiltnamyje, bet gali būti auginami ir lauke.

### Vaisiai:

- sveria apie 200 g
- dauguma sveria nuo 220 g iki 240 g
- tipiška tradicinių avietinių pomidorų forma
- dideli, briaunoti, patrauklios avietinės spalvos vaisiai
- mėsinga vaisiaus struktūra, geras skonis
- labai geras vaisių kokybinis patvarumas

### Augalas:

- Stiprus ir stabilus augalo gyvybingumas per visą sezoną
- gerai užmezga vaisius

## Mamston F1 geras derlius, puiki prekinė išvaizda



### Atsparumas:

**HR:** Fol: 1, 2 / For / V / TMV: 0 / ToMV: 0-2; **IR:** M / TYLCV

### Augalo ypatybės:

- vaisiai avietinės spalvos, šiek tiek paplokščios formos, briaunoti, sveria apie 180 g, vaisiai geros kokybės, tvirti, tinka transportuoti
- stabilus augalo gyvybingumas visą sezoną
- augalas gerai mezga vaisius
- indeterminantinis hibridas

### Paskirtis:

auginimas tunelinio tipo šiltnamiuose, prailgintas auginimas šiltnamiuose

## Bobcat F1 derlingas hibridas



### Augalo ypatybės:

- vaisiai apvalūs, šiek tiek briaunuoti, raudoni, sveria apie 200 g
- labai aromatingi ir itin gero skonio
- stipraus augimo hibridas
- augalai atsparūs: tabako mozaikos virusui, verticiliozei, Fusarium genties grybinėms ligoms, sukeliančioms fuzariozę, fuzariozinį šaknų puvinį, lapų rudąją dėmėtligę

### Paskirtis:

vidutinio ankstyvumo veislė, auginimui atviraime grunte ir po uždangomis

## Hapynet F1 avietiniai pomidorai auginami lauke



### Augalas:


- savidulkis augalas, skirtas auginti grunte
- stiprus gyvybingumas, vešli lapija
- didelis atsparumas viršūniniam vaisių puviniiui
- gerai užmezga vaisius esant aukštai temperatūrai
- didelis derliaus potencialas esant mažiau palankioms augimo sąlygoms
- naudojimas: šviežiai rinkai ir perdirbimui

### Vaisiai:

- avietinės spalvos, dideli, mėsingi, šiek tiek suploti, sveria 190 - 230 g (esant palankioms sąlygoms net daugiau kaip 300 g)
- vaisiams būdinga vienoda avietinė spalva
- geras vaisių skonis ir švelni tekstūra

## Miceno F1

augalas atsparus sudėtingoms aplinkos sąlygoms, tvirta šaknų sistema



### Augalo ypatybės:

- stiprus ir sveikas hibridas užtikrina aukštą vaisių kokybę iki pat derliaus nuėmimo pabaigos
- optimalus, subalansuotas augalų vystymasis ir stipri šaknų sistema
- didelis derliaus potencialas
- 80 - 90 g vaisiai, rutuliški, labai taisyklingi, tolygios ir intensyvios spalvos viduje ir išorėje
- atsparumas sausam viršūniniam vaisių puviniiui
- pomidorai skirti ankstyvajam derliui
- tolygus vaisių nokimas leidžia naudoti mechanizuotą derliaus nuėmimą

### Taikymas:

universalus – sultims, tyrei gaminti bei šviežių produktų rinkoje.

# Edamso F1

geras derlius, lengva auginti



### Atsparumas:

**HR:** ToMV: 0 – 2 / TMV: 0 / Fol: 0 – 1 / V / Ff: A – E

### Augalo ypatybės:

- vaisiai 180 - 220 g, tolygios raudonos spalvos, apvalūs, šiek tiek paplokšti
- labai išlygintas, BB dydžio, geros išvaizdos
- labai atsparus vaisiaus galiuko puviniai, odelės trūkinėjimui
- ilgai išlieka švieži ir kieti po derliaus nuėmimo
- stabilus augimas net esant aukštai temperatūrai
- lengvai prižiūrimas (tiesiai augantis stiebas, kompaktiški lapai, tolygus augimas)

- gera pusiausvyra tarp augimo ir vaisių sunokimo
- geras, kokybiškas, ankstyvas derlius

### Pastabos:

priklausomai nuo auginimo tankumo, galima reguliuoti augimo tempą, vaisių dydį

## Hibridinių augalų charakteristika

Pavadinimas	dydis (mm)	svoris (g)	šiltnamio	polietilenuose šiltnamiuose ir po uždangomis	lauko	apibūdinimas
<b>Standartiniai pomidorai, auginami šiltnamiuose</b>						
<b>Edamso F1</b>	67/102	180 - 220	+			labai gausus derlius, puikiai tinka šiltnamyje
<b>Dideli pomidorai, auginimui po uždangomis ir atviraime grunte</b>						
<b>Carmello F1</b>	82-102	170 - 220		+		minkštesni, labai skanūs, dideli vaisiai
<b>Bobcat F1</b>	82-102	200 - 220			+	ryškiai raudonos spalvos tvirti vaisiai, itin gero skonio
<b>Happynet F1</b>	82-102	> 200			+	avietiniai pomidorai auginami lauke
<b>Miceno F1</b>	45-57	80 - 90			+	atsparumas ir tvirta šaknų sistema, leidžia augti esant nepalankioms sąlygoms
<b>Standartiniai pomidorai, auginimui po priedangomis ir atviraime grunte</b>						
<b>Sandoline F1</b>	57/82	160 - 180		+		kokybiški dideli vaisiai
<b>Brooklyn F1</b>	57/67	150 - 180		+		stipri šaknų sistema, gausus derlius
<b>Baribine F1</b>	57/67	140 - 150		+		ankstyvas derlius ir atsparumas lapų rudajai dėmėtigai
<b>Boderine F1</b>	57/67	140 - 150		+		vaisiai geros prekinės išvaizdos
<b>Delfine F1</b>	57/67	140 - 160		+		tolygaus dydžio, intensyvos raudonos spalvos vaisiai
<b>Avietiniai pomidorai, auginimui po uždangomis ir atviraime grunte</b>						
<b>Mamston F1</b>	57/82	170 - 190	+	+		gausus derlius, puiki prekinė išvaizda
<b>Manekro F1</b>	67-82	200 - 400	+	+		dideli vaisiai, didelis derlius, auginimas išplėtotas iki 16 kekių
<b>Naujienos</b>						
<b>Angelle F1</b>	20-35	11 - 12	+	+		raudoni slyviniai, ovalo formos
<b>Bambelo F1</b>	20-35	10 - 12	+	+		oranžiniai slyviniai, ovalo formos
<b>KM 5512 F1</b>	25-40	13 - 17	+	+		puikaus skonio mažieji juodieji pomidorai
<b>Olmecca F1</b>	47/67	100 - 120	+	+		puikaus skonio juodieji pomidorai
<b>Arawak F1</b>	67/82	120 - 150	+	+		"jaučio širdys", mėsingi

## Yecla F1 ankstyvas ir gausus derlius



### Augalo ypatybės:

- „block” rūšies raudonųjų paprikų hibridinis augalas
- vidutinio dydžio augalai, puikiai mezga vaisius
- vaisiai 160 - 180 g svorio, intensyvios raudonos spalvos
- vaisiai turi ilgus kotelius, todėl lengviau nuimti derlių

### Paskirtis:

ankstyvas hibridas, auginimui plėvele dengtuose šiltnamiuose

## Katmandu F1 gausus derlius



### Segmentas:

„block” rūšies hibridas, auginimui šiltnamiuose

### Atsparumas

HR: Tm 3; IR: Lt / M / TSWV

### Vaisiai:

- 190 - 240 g, „block” tipo, vienodos formos
- vienodo dydžio vaisiai – storos sienelės
- puiki vaisių kokybė
- tolygiai ryškios raudonos spalvos
- geras vaisių patvarumas, aukšta prekinė kokybė
- didelis bendras prekinis derlius

### Augalas:

- stiprus, gyvybingas, aukštas augalas, gera šaknų sistema
- platus atsparumo paketas
- geras augalo derliaus balansas ir stabilus augimas
- geras atsparumas nepalankioms augimo sąlygoms.

## Jupiter auginimui lauke



### Augalo ypatybės:

- „block” rūšies veislė
- augalai vešlia lapija, kuri apsaugo vaisius nuo saulės
- vaisiai apie 160 - 190 g svorio, raudoni, gero skonio
- augalas atsparus tabako mozaikos virusui

### Paskirtis:

vidutinio ankstyvumo veislė tinkama auginti atvirame grunte

## Kiiroi F1 patikimas geltonųjų paprikų auginimas



### Vaisiai:

- intensyvi geltona spalva, puiki vaisių kokybė
- 180 - 210 g svorio, storomis sienelėmis
- stabilus vaisių dydis visą sezoną
- tinka ilgam sandėliavimui
- aukšta, ilgalaikė vaisių prekinė kokybė

### Augalas:

- stiprus gyvybingumas, stipri šaknų sistema
- platus atsparumo paketas, kurio neturi kiti geltonųjų paprikų hibridai
- aukštesnis augalas, optimaliai pasiskirstę vaisiai netrukdo augti

## Kornelya F1 ankstyvosios kūginės formos paprikos



### Segmentas:

„Kapia” tipo, auginimui šiltnamiuose ir lauke.

### Atsparumas:

**HR:** Tm 0-2; **IR:** TSWV:0

### Vaisiai:

- būdinga pailga forma
- vaisiai vienodo dydžio, 18 - 20 cm ilgio, 5 - 7 cm skersmens
- vaisiaus sienelės storos ir saldžios, tinka kepti ant grotelių ir vartoti šviežius
- ryškiai raudonos spalvos, labai patraukli išvaizda

- būdingas vaisių dydis išlieka per visą vegetacijos periodą
- vaisių galiojimo laikas labai ilgas, puikiai išlaiko aukštą prekinę kokybę

### Augalas:

- subalansuota forma su labai gera lapija
- labai geras vaisių užmezgimas esant aukštai temperatūrai
- tinka auginti šiltnamyje ir atvirame grunte

## Sahem F1 aštrioji paprika



### Segmentas:

„KIMCHI” tipo aštriosios paprikos, auginamos šiltnamyje ir lauke

### Atsparumas:

**HR:** PVY

### Vaisiai:

- vaisius siauras, ilgas, labai pailgas, būdingas „kimchi” tipo aštriosioms paprikoms
- vaisiaus ilgis 12 - 16 cm
- vaisiai yra patrauklios žalios spalvos ir derliaus nuėmimo metu prinoksta iki raudonos
- vaisiai blizgantys, intensyvios spalvos

### Augalas:

- stiprus augalo gyvybingumas, atsparūs žemesnei temperatūrai
- reikalingos atramos visą vegetacijos sezoną
- galima auginti šiltnamiuose ir lauke

## Hibridinių augalų charakteristika

Augalo pavadinimas	vaisius			savybės
	spalva	dydis	vid.masė	
<b>Yecla F1</b>	raudona	8 x 10	160 - 180	ankstyviausia iš raudonų paprikų segmento
<b>Jupiter</b>	raudona	11 x 11	170 - 180	lauko paprika
<b>Blondy F1</b>	šviesiai geltona	8 x 10	140 - 150	ankstyvas hibridas, geltonai kreminė spalva
<b>N Kiirroi F1</b>	geltona	8 x 10	180 - 210	dideli aukščiausios kokybės vaisiai
<b>Balta F1</b>	raudona	11 x 13	250 - 280	dideli vaisiai šviežių daržovių rinkai
<b>Dimention F1</b>	šviesiai geltona	6 x 13	140 - 150	šviesiai gelsvos spalvos, kūginės
<b>N Katmandu F1</b>	raudona	8 x 10	190 - 240	stiprus augimas ir lapija, vaisiai optimaliai pasiskirstę ant augalo
<b>N Kornelya F1</b>	raudona	7 x 20	160 - 170	stambūs, patrauklios formos vaisiai, didelis derlius
<b>N Sahem F1</b>	raudona	3 x 22	50 - 60	„Kimchi“ tipo aštrioji paprika

**N** – naujiena





# darzoviuseklos.lt

Syngenta sėklomis Lietuvoje prekiauja

Informacija ir sėklų užsakymas telefonu:

**+ 370 347 55 262**

arba

**+ 370 614 67 288**

Konsultacijos dėl "Syngenta" sėklų:

**+370 615 40 251**

Elektroninis paštas:

**e prekyba@darzoviuseklos.lt**

**info@darzoviuseklos.lt**

Lauko g. 1A, Šingalių k.,  
Kėdainių raj., LT-58191

## syngenta®

DIRBdami su augalų apsaugos produktais  
PRIVALOTE NAUDOTI APSAUGOS PRIEMONES

